


# La pyrale du buis

## *Cydalima perspectalis* (Ordre des Lépidoptères)

Originnaire d'Asie, la pyrale du buis est un lépidoptère phytophage spécifique du buis, observé pour la 1<sup>ère</sup> fois en Europe : en Allemagne en 2007, puis en France en 2008 (en Alsace).

Depuis, ce papillon se retrouve dans toute la France.



### Période de vol du papillon

J F M A M J J A S O N D

### Dégâts

Les chenilles sont très voraces :  
défoliation du buis en quelques jours !



Les chenilles se nourrissent des feuilles de buis.

Elles y tissent des cocons en soie pour rester à l'abri l'hiver jusqu'à reprendre leur activité début du printemps.

Leurs déjections verdâtres puis noirâtres sont un indicateur de leur présence ...

### Quelles solutions ?

#### Prévention

Installez des nichoirs pour favoriser la prédation par les oiseaux !

Depuis quelques années, des consommations de chenilles de pyrale du buis par des mésanges et des geais commencent à être observées.

#### Détection, Suivi & Piégeage

Un piège à phéromone pour attirer spécifiquement la pyrale du buis, aider à connaître les périodes et l'intensité des attaques.

La phéromone se place dans un piège Funnel (réutilisable) et a une durée de diffusion de 4 à 6 semaines.

Mise en place des pièges fin Mars (début des vols).  
Il faut 6 capsules pour couvrir l'ensemble des vols.  
Changer la capsule toutes les 4 à 6 semaines.



En savoir plus sur le piège